



Vacinas	Esquemas e recomendações	Não gestante	Gestante	Puérpera	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
					Gratuitas na rede pública	Clinicas privadas de vacinação
(2)						
(3)	Hepatite A: duas doses, no esquema 0 - 6 meses.					
	Hepatite B: três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses.					
	Hepatite A e B: três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses.					
(4)	Atualizar dTpa independente de intervalo prévio com dT ou TT. Com esquema de vacinação básico para tétano completo: reforço com dTpa a cada dez anos. Com esquema de vacinação básico incompleto: uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com uma ou duas doses de dT (dupla bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico. Para mulheres que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica: recomenda-se a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP). A dTpa-VIP pode substituir a dTpa, inclusive em gestantes. Considerar antecipar reforço com dTpa: para cinco anos após a última dose de vacina contendo o componente pertussis para mulheres contactantes de lactentes. Durante a gestação* ver quadro ao lado.					
(2)	Para suscetíveis:					
(5)						
(2, 6)						
Menincica B						
(8)	Calendário de vacinação SBIIm idoso					
	Calendário de vacinação SBIIm idoso					

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Histórico vacinal	Conduta na gravidez	Conduta após a gravidez
-------------------	---------------------	-------------------------

Previamente vacinada

uma dose

duas doses